


Az RU-486 abortusztabletta

Az RU-486 méreg.
Akkor öli meg a magzatgyermeket,
mikor már dobog a szíve.

Eddig 11 terhes nő haláláról tudunk.

Ki következik?



MIFEPRISTONE

A kiadvány eredeti címe: *RU-486 a human pesticide*
Hayes Publishing Co. Inc., 6304
Hamilton Avenue, Cincinnati, Ohio 45224

Kiadó: Kiáltás az életért Egyesület – 2005
Minden jog fenntartva.

Az RU-486 abortusztabletta

Az RU-486 (*Mifepristone* vagy *Mifeprex*) olyan mérge, amely meggátolja a megfogant emberi élet táplálásához szükséges hormon, a *progesteron* termelődését. Legalább két héttel korábban az orvosi kifejezéssel embriónak nevezett magzatkorú gyermek már beágyazódott az anyaméh táplálékkal szolgáló falába. Akkora, mint egy szőlőszem.

Ha a szőlő szárát összecsípvé megakadályozzák, hogy a gyökerek és indák felől érkező tápanyag eljusson a fűrtbe, akkor a szőlőszem elfonnyad és le hull.

A *prostaglandin* nevű másik szert arra használják, hogy görcsös méhösszehúzódásokat okozva az elhalt magzatgyermeket kihajtsák a méhből. Ha e kémiai abortusz mégsem következne be, akkor a babát sebészi abortusszal, kaparással távolítják el.

Az RU-486-tal előidézett kémiai vagy mérgezőes abortusz csak az utolsó havi vérzés első napjától számított 5., esetleg 7. hétig végezhető el. Néhányan ugyan később is alkalmazhatónak tartják, de a 9. hét környékén már jelentősen csökken a szer hatása.

Az önmagában alkalmazott RU-486 az esetek 60-80%-ában öl meg a magzatgyermeket, *prostaglandin* hozzáadásával a mérgekötél hatásfoka 95%.

Ki felel ezért?

1994 májusában a német Hoechst, ez a frankfurti gyógyszeripari óriáscég jóváhagyta, hogy francia leányvállalata, a Párizsban működő Roussel Uclaf cég átadja az RU-486 szabadalmát a New Yorkban székelő abortuszpárti csoportnak, az úgynevezett Népesedési Tanácsnak. Tesztelés után ők a Danco vállalatra bízták a szer gyártását. A Clinton-kormányzat nyomására az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügy Hatóság (FDA) 2000 szeptemberében az életmentő gyógyszereknek járó soronkívüliséggel engedélyezte a mérge forgalmazását.

Amerikai életvédők többször világosan kijelentették, hogy a szabadalom átadása esetén bojkottálják az összes Hoechst terméket. A bojkott hatására a cég Aventis SA-ra változtatta nevét. A hitleri Németországban az I.G. Farben tulajdona volt az a Degesch nevű részvénytársaság, amely a koncentrációs táborok gázkamráiban emberirtásra használatos Zyklon-B-t gyártotta. Az I.G. Farben a háború után három vállalatra oszlott, ezek közül az egyik a Hoechst AG, amelynek leányvállalata az új emberirtó szert kifejlesztő, francia Roussel Uclaf.

Az eljárás menete

- 1. beavatkozás:** Mindenre kiterjedő egyéni és családi kórelőzmény-felvétel, fizikális vizsgálat, vérkép. Ha a terhes nő vérszegény, magas a vérnyomása, ha cukros, asztmás, vese- vagy májbeteg, ha dohányos, ha zöld hályogja van, vagy 35 évesnél idősebb, akkor a kémiai abortuszra vonatkozó kérelmet el kell utasítani. Ultrahangos vizsgálatra is szükség van, hogy ezzel megállapítható legyen a magzatgyermek életkora, és kizárható legyen az esetleges méhen kívüli terhesség. A terhes szájon át beveszi a magzatgyermeket elpusztító, első pirulát, a progeszteron termelését gátló, RU-486 (Mifepriston vagy Mifeprex elnevezésű) tablettát.
- 2. beavatkozás:** Két nappal később a nő visszatér, hogy megkapja a második, prosztaglandin tartalmú (Cytotec vagy Misoprostol) tablettát, majd hazaküldik. Órák vagy napok múlva a magzatgyermek testének részecskéi a terhességi szövetekkel együtt erős görcsök közepette eltávoznak a méhből.
- 3. beavatkozás:** Később -de 14 napon belül- ultrahangos vizsgálatra lehet szükség annak megállapítására, hogy kiürült-e a méh. Ha még nem, vagy még mindig erősen vérzik, akkor a méhet tágításos eljárással ki kell kaparni. A francia Egészségügyi Minisztérium az abortuszt végző intézményeknek előírja az elektrokardiográffal történő műszeres felszereltséget, továbbá, hogy elérhető legyen egy defibrillátorral összekapcsolt „crash cart” is arra az esetre, ha az emberirtő szer szívrohamot okozna. Az USA-ban szinte egyetlen francia előírást sem kell betartani. A mérgezőes magzatelhajtást Magyarországon állandó egészségügyi felügyelet mellett tervezik előmozdítani.

A járulékos hatások

▶ Vérzés

A legtöbb esetben általánosnak tekinthető a hosszan, akár 30 napig is elnyúló, vérzések időszak. A felmérések szerint az eljárás miatt 100-ból 1 nőnél olyan erős a vérzés, hogy sebészi kaparást, vagy vérátömlesztést kell alkalmazni. Néhány nő a fellépő heveny vérzésbe halt bele.

▶ Fájdalomérzés

A vizsgálatok változó eredményekről számolnak be, de a páciensek több mint felének különleges fájdalomcsillapítóra, harmadrészüknél narkotikumra van szüksége. A legtöbbször szédüléssel és hányással is jár.

▶ Méhen kívüli (méhkürti) terhesség

E vegyszerek nem ölik meg a méhkürtben, vagyis méhen kívül fejlődő magzatgyermeket. Vérzés ugyan bekövetkezhet, de ez nem mindig a baba elhajtását jelzi, ugyanakkor hirtelen megrepedhet a méhkürt. Ennek következtében több terhes halt meg.

▶ Nem mindig hajtja ki a gyermeket

Szükségessé teheti a méhtágításos, kaparásos magzatelhajtást.

▶ Az emlőrák kialakulásának esélyét megsokszorozza

▶ A lelkiállapot felborulása

Dr. Edward Sakiz, a Roussel Uclaf akkori elnöke nyilatkozta: „Az, hogy a terhes nőnek egy teljes hétig együtt kell élnie ezzel az elhúzódó beavatkozást jelentő helyzettel, igen súlyos lelki tehertétel.”

Néha a terhes nő azt észleli, hogy a magzatgyermek testrészei darabokban jönnek ki belőle. Szigorú utasítás, hogy egy edényben minden ilyen darabkát össze kell gyűjtenie, majd bemutatni az abortőrnek, hogy

Az RU-486 abortusztabletta

ellenőrizhesse, a baba minden porcikája kilöködött-e. a sebészi abortuszoknál ritkán fordul elő, hogy az állapotos nő meglássa a baba testrészeit. Ennél a kémiai abortusznál mindent lát, és a tragikus látvány soha nem törlődik ki az emlékezetéből. Pszichiátriai betegségek ellenjavallatot jelenthetnek.

► Abortusz utáni lelki egyensúlyvesztés (Post-Abortion-Syndrom)

A legtöbb, abortuszt fontolgató terhes nő kétségek között vergődik. Elhárító magatartása így hangozhat: „Nincs más választásom, nem látok más megoldást. De bárhogya is van, ezt nem én teszem, hanem ők.”

Az RU-486 esetében azonban maga a nő nyeli le a méregtablettát, vagyis nem elszenvedi, hanem előre megfontolt módon, maga hajtja végre a cselekményt. Bár még nincs elégséges számú tanulmány ezzel kapcsolatban, de a jelzések arra utalnak, hogy e méhen belül bevethető vegyi fegyver alkalmazását követően több lelki szövődémmel is kell számolnunk, mint a sebészi úton végrehajtott magzatelhajtásnál.

► Hosszú távú hatásai ismeretlenek

A szer rendkívül erősen beavatkozik a női szervezet működésébe. Az anyára és annak később születendő gyermekeire gyakorolt hosszabb távú következményei jelenleg még nem teljesen ismertek.

► Halálozás

2005. februárjáig tizenegy olyan terhesről tudunk, akiknek halála bizonyítottan és közvetlenül az RU-486 rovasára írható. Az első halálesetet Franciaországból jelentették, ahol a méregtabletta keringési rendellenességet váltott ki. Egy másik, kanadai nő úgynevezett posztoperatív fertőzésben halt meg. Kaliforniában a Tervezett Szülőség által működtetett abortuszklinikán szeptikus sokkban hunyt el egy 18 éves beteg. További három kaliforniai esetről számol be az FDA. Az USA Tennessee Államában olyan terhes halt meg, akinek állapotát az RU-486 bevitelét követően végig ultrahangos ellenőrzéssel követték. Az angol Egészségügyi Főhatóság két halálesetet tart nyilván. Legutóbb egy 23 éves svéd lány halt meg a szer alkalmazását követően.

► A magzatgyermek károsodása

Az RU-486 prosztaglandinnal együtt 95%-ban okoz kémiai abortuszt. A többi terhes nőnek sebészi magzatelhajtással is szembe kell néznie. Vannak azonban olyanok, akik nem vetik alá magukat a sebészi beavatkozásnak, és kihordják a kisbabát. Az így világra jött újszülöttek súlyos fejlődési rendellenességet mutathatnak. Miért? Mert a két mérgező anyag éppen akkor került az anya és a magzatgyermek szervezetébe, amikor a szív, a vese és más szervei fejlődtek. A szer ugyan nem pusztította el teljesen a kisbabát, de a mérgező anyaggal való közvetlen érintkezés ugyanolyan súlyosan megzavarta a szervezet egészséges fejlődését, mint ahogyan azt a *Thalidomide* nevű szer esetében látjuk.

Braziliában a Cítotec recept nélkül is kapható. Némelyek önmagában használják ezt a szert magzatelhajtásra, amely azonban nem feltétlenül okoz magzat elvesztést. Az így világra jövő újszülöttek koponyája, végtagja torzulásokat mutathatnak. Mindezeket túl genetikai ártalmakat is okozhat a fejlődő magzatgyermekben.

Miért javasolják mégis?

Az abortuszpártiak azt állítják, hogy a sebészi úton végrehajtott magzatelhajtással szemben a kémiai vagy mérgezőes abortusz „előnyökkel” jár. Mindez cáfolható.

Diszkrétebb? Gyorsabb? Nem diszkrétebb, hiszen az abortuszkérelmezést érintő törvényes feltételek itt sem hiányoznak. Nem gyorsabb, sőt hosszadalmasabb, hiszen a jelenleg alkalmazott szívásos magzatelhajtás (aspirációs interruptio) egyetlen beavatkozással jár, míg az URH-486 alkalmazásával két esetleg négy beavatkozásra is szükség lehet. A nőnek gyorsabban kell döntenie, de a beavatkozástól tovább szenved.

Olcsóbb? Nem, hiszen az aspirációs interruptio (vagyis kiszívásos, sebészi magzatelhajtás) 1 ápolási nappal számítva 25.798 forintba kerül. Méregtablettás magzatelhajtásnál 2-4 beavatkozás esetén legalább 3 alkalommal történő kórházi megjelenés, a laboratóriumi, ultrahangos vizsgálatok és az alkalmazott szerek ára meghaladhatja az eddigi beavatkozási forma költségeit.

Biztonságosabb? Valószínűleg nem. Esetleges bevezetése dekriminalizálva megkönnyíti a feketepiaci beszerezhetőséget, alkalmazása teljesen ellenőrizhetetlenné válik.

Kisebb fájdalommal jár? Nem. Bár a vákuumos magzatelhajtás fájdalmas, a páciens azonban gyorsan túl van rajza. Méregtabletta esetén a beavatkozás a 4 órát is meghaladja.

Gyógyító célú használat

Napjainkig semmi sem igazolja, hogy az RU-486 alkalmas lenne bármely emberi betegség gyógyítására. A jelenleg folyó kutatások célja annak megállapítása, hogy vajon a tablettának van-e bármiféle jótékony hatása az emlőrák, az agytumor (*meningioma*) a Cushing-szindróma, vagy az *endometriosis* kezelésében. Egyetlen komoly kutatás sem igazolt semmiféle ilyen hatást. Az életvédő mozgalom sosem helyezkedett szembe azzal, hogy az RU-486-ot bizonyítottan indokoltan gyógyászati célra alkalmazzák. A máig fellelhető tanulmányok mindegyikét vagy a gyártóval kapcsolatban álló szervezetek vagy közvetlenül a gyártó finanszírozta.

Esemény utáni tabletták?

Kutatások folynak annak megállapítására, hogy vajon az RU-486 alkalmas-e a közösülés utáni terhesség megszakítására. Eddig semmi ilyesféle hatást nem igazoltak.

Betiltották, kivonják

Az RU-486 gyártóját, a Danco Laboratories-t a Kajmán-szigeteken jegyezték be. Magát a mérget Kínában gyártják. Kanadában már az első terhes halála után betiltották. Az Amerikai Egyesült Államokban az eddig regisztrált halálesetek és egyéb súlyos szövődmények miatt napirendre tűzték az erőltetett ütemű bevezetés felülvizsgálatát és a szer piacról történő kivonását.